

12

QUÆSTIO MEDICA

PRO BACCALAUREATU

MANE DISCUTIENDA

IN ALMA MONSPELIENSIMUM MEDICORUM ACADEMIA

PRÆSIDE

R.D. JOANNE CHATELAIN

PROFESSORE REGIO,

ET DECANO ADMODUM VENERANDO,

SUB HAC VERBORUM SERIE.

*AN VICTUS RATIONE PRÆPEDIRI POSSIT
generatio calculi.*

I RIS affectibus qui in humanum corpus sœviunt, non immie-
rito annumerandus est renum, & vesicæ calculus, corpus durum,
raro lœve, plerumque asperum, ex materia tartarea, glutinosa, &
salina, in corum cavitatibus ut plurimum genitum, obstructio-
nem, distentionem & lacerationem patiens.

Quo facilius calculi concretionem Eruamus Chymicam ipsius analysim
præmittendam censuimus, quippe exploratis seorsim partibus illum compa-
gentibus perspectisque earum mole & figurâ lumen rimandæ ejus compositioni
intimæ fænorabitur, distillationi subjectus magnam salis Alkalini volatilis
& terræ, parvam vero phlegmatis, olei, & salis fixi quantitatem prodit;
quis autem moleculas terrenas, salia Alkalina volatilia fixaque in convenienti
proportione, favente ipsarum figurâ, interventu paucilli olei (quo illæ coag-
mentantur, & phlegmatis quo parum ab invicem disturbantur, & salia ad
sulphura carminanda idonea vix ac ne vix quidem dissolvuntur sed potius
omnium intercapedines exactius opplentur, ita ut singulæ sibi quasi ad amus-
sim quadrent, in corpus durum, seu cuius partes ægre admodum à sese di-
velluntur faciliter, premente aëre circumfuso aut vasis vicinis coalescere
posse, inficias ire queat.

Non est arduum conceptu quo pacto partes tartareæ & salinæ mediante
lymphâviscidâ una cum sero per patulas renum glandulas secretæ, in calcu-
lum facescant.

Varia calculorum figura à variis locis in quibus efformantur aut à diversâ principiorum combinatione , deducenda est ; cum fistularum , infundibulorum & peluis per quæ urina trajicienda est nec eadem sit figura , nec eadem amplitudo & calculorum principia valdè disparata , sint , indefinitis modis combinari , cohærere & ad quietem respectivam , deficiente seroso latice reduci queant , non mirum si calculi in renibus sicut & in vesica progeniti diversam figuram & magnitudinem obtineant.

Ex modo quo efformantur calculi arenularum & lapillorum genesis innotescit , si enim paucæ aliæ partes Elementares vel in strictioribus renum canaliculis vel in latiorum eorumdem tubulorum vel meatuum spatiis sero ad fluxilitatem conservandam destitutæ , concurrant , inde arenulæ , si vero vel jam concretæ arenulæ pro superficerum congruitate & extrinseca pressione sibi adaptentur , & arctius copulentur , Emergent lapilli , si lapilli , qui calculorum primordia audiunt , una cum sero urinoso per ductus renales , & ureteres ad vesicam non obstante mole abripiantur , ibique diurniorem moram contrahant , in mediis fluidis , concursu præsertim partium humoris cæmenti vices gerentis in calculos grandiores concrescent.

Calculi in vesicæ cavo raro generantur , quin prius lapilli ex renibus in illud devoluti fuerint , ratio est . Quod majori urinæ proventu moleculæ ipsius generationi oportunæ à mutuo contactu removeantur , non secus ac urina in matulis diutius retenta sedimentum tartareum majoris consistentiæ deponit ; ita in meditabundis , curis aut animi sollicitudine distractis vesicis , circumjectis fluidis calculi aliquando producuntur.

Causæ calculi aliæ sunt externæ aliæ internæ , ad externas reducuntur illa omnia quæ uberiorem tartari proventum sanguini suppeditare valent , qualia sunt vinum prætermodum crassum , carnes salitæ , & fumo induratæ , alimenta terrestria , metus & tristitia , aliæque res non naturales , de quorum agendi modo brevitatis ergo supersedemus ; ad internas vero , massæ sanguineæ crazis , vel renumque constitutio , quæ illos ad calculum disponit , glandularum & tubulorum laxitas vel horum angustia , relaxatæ glandulæ crassiores particulas admittunt , & retinent , hinc particulæ crassiores in unum coalescent . tubuli angustiores tartareas , terrenas & salinas coarctant , & expresso sero cui innatant lapideam duritiem ipsis conciliant.

Liquido igitur constat calculus phlogozí renum subsequenti occasionem præbere ; quia calculus vasa in quibus continetur irritat , & sanguinis circulationem impedit , unde vasorum disruptio & inflammatio.

Absit igitur ut virtutem lapidificam cum antiquis pro calculorum causa assignemus , solo obscuritatis nomine illa opinio jam dudum exulavit.

Pro majori calculorum mole , scabritie vel inæqualitate eorum superficie , vi qua adiunguntur renum & ureterum tensione , sensu & angustia , dolores atrocioreſ excitantur ; exquisitiores in ureteribus quam in renibus ob plures quibus donantur nervorum propagines , persentiuntur ; Dolor fit gravatus hærente calculo , laxatis renibus à sero & humoribus moram trahentibus ; lacinans à calculorum angulis magna vi ductuum latera præternaturaliter tensa impetentibus , dilacerantur renes & ureteres ab inæquali calculorum superficie.

Prætermodum distentis ureteribus distrahuntur vasa deferentia illos trans-

cendentia proindeque testes ipsis annexi superius adducuntur; corporis femur & crura, à compressis nervis iis prōsipientibus, renum & ureterum distinctione nimiā, formicationis sensus ab humoribus in illis moram trahentibus, ortum dicit.]

Supprimitur urina vel ex toto, vel ex parte, pro ut ipsius commeatus à calculo per suos canales magis vel minus præpeditur; lotium intra vasa redundans, affectus soporosos, modo hydropem inducit, quandoque per glandulas cutaneas sub sudoris forma errumpit, aliquando pro ratione analogiæ quam habet cum fermento stomachali, vel intestinali, vel pro earumdem laxitate in stomachi uel intestinorum cavitates illabitur, nauseam vel vomitum, vel dejectiones per anum, fibrillas eorum nerveas irritando, provocat; nonnumquam urinæ sunt purulentæ, quoniam à calculo dilacerante vel inflammationem pariente, sic abscessus aut ulcus, frunt sanguinolentæ ruptis vel erosis à calculo interioribus vasis sanguiferis prædictarum partium, lotium redditur limpidum, quia propter arenulas ejus cavitates occupantes, partes tenuiores dumtaxat secerni possunt, sabulosum & crassum eo quod dilatatis & relaxatis ductibus arenulæ & viscidiores materiae renes infestantes, una cum ipso ubertim ad vesicam indeque per urethram foras expellantur; innatans urinæ calculus saepius impingit in vesicæ collum, crebrius mejendi desiderium crebramque micturitionem, promovet.

Colicus dolor, & nephriticus à calculo, affectus non solum locis affectis sed etiam dolorum specie identidem distinguntur, in priori non raro dolores vagi qui totum abdomen occupant, murmura & borborigmi propter intestinorum anfractuosas circumvolutiones persentiuntur; in nephritide vero in eadem semper parte renumque regione, percipiuntur, an à calculo vel ab aliqua alia causa, nempe inflammatione, nephritis producatur, ab urinæ purulentæ excretione, vel à vulnere præpostere suscepto. dignoscet. Sed immensum foret sigillatim signa recensere.

Cognitâ causâ fovente, prognosim variam instituendam esse patet, si nephritis à calculo uno aut pluribus iisque grandioribus & valde induratis in rebus pendeat, nullisque remediis levari possit, periculi plena est; quia supprimitur urina, ex urinæ suppressione, ut ait Hypp. *Nisi ante septimum diem minixerint pereunt*, serum enim excrementitium in sanguine regurgitans, nullas non inficit ejus partes recrementitias, alibiles inquinat, ac operationes variè lœdit, hinc phlogoses; ulceræ, dolores atroces, vigiliæ, virium dejectionem, aliaque perniciosa, & ob causæ contumaciae funesta symptomata, infert, si vero partium refrigeratione, pulsu debili & languido, sudoreve frigido stipata sit, ex his etiam mortem instare certo arguitur, sed si à lapillis minoribus, arenulis friabilibus nondum concretis, aut à materia sabulosa ortum accipiat, nec notabili urinæ suppressioni conjugatur, nec remedia eludat, per crassarum & sabulosarum urinarum ejectionem soluetur; pessimi ominis est nephritis calculosa quoties hereditaria est, sive à parentibus calculosis contracta, vel ætati senili superveniens, in ea enim ex Hypp. aphor. 6°. sect. 6. *Vitia renum & vesicæ difficilius curantur*. Eadem fere de calculo vesicæ prognosis instituenda. si calculus maior, asper, angulosus, & affixus sit, quia nec conteri, nec disolui, nec

per urethram eliminari, potest.

Curationis scopus in paroxismo est, ut præpediatur inflammatio, mictioque suppressa procuretur, calculi ad vesicam præcipitentur, si parui foras eliminantur, dolor compescatur, & quies & somnus concilientur, quibus attingendis varia prorsus usurpanda venit therapeia, primo quidem mire præstat sanguinis missio, quod non solum ad cutiorem felicioremque illius eventum, sed etiam quia sola venæ seclusio urinæ profluvium fere subito procuravit; modo attenuantia, discutientia, diaphoretica, spirituosa, acria, roborantia, diuretica calida, modo emollientia, relaxantia, narcotica, anodynæ, lenientia, diuretica frigida, quorum omnium copiosa sylva apud authores prostat, usurpanda sunt; cavendum tamen à nimio diureticorum usu, hæc urinam suppressisse ex authoribus habemus, conducunt, ut paucis absolvam, & ea omnia medicamenta quæ calculum arrenulasque foras propellere possunt ex prædictis seligere est, modo universalia particularibus debita ratione adhibeantur, si ardor magnus in renum regione molestusque sit, oleo violaceo aut rosaceo inungentur, in vesicam autem si calculus illapsus sit, medicamentisque supra dictis ob magnitudinem, aut vesicæ cohæsionem excludi nequeat, ad Lythotomiam deveniendum est, quæ quam sit periculosa & terrifica nemo non videt. Extra paroxismum occurrentum ipsius genesi, in hunc finem non suppeditentur sanguini materia crassæ & viscidæ ex abusu rerum non naturalium, illi restituetur naturalis fluiditas; sed hoc mire præstat victus ratio.

ERGO Fure Concludo.

Victus ratione præpediri potest generatio calculi.

DISPUTATURI.

PROFESSORES REGII.

R. D. Franciscus Chicoyneau,
Cancellarius.

R. D. Joannes Bezac.

R. D. Petrus Chirac.

R. D. Petrus Magnol.

R. D. Antonius Deidier.

PROFESSORES REGII.

R. D. Petrus Rideux.

R. D. Antonius Magnol, Patris
Coadjutor.

DOCTORES.

R. D. Henricus Haguenot.

AGREGATI.

R. D. Joannes Henricus Haguenot,
Patris Coadjutor.

DOCTORES ORDINARII.

M. Eustachius Marcot.

M. Antonius Fizes.

Propugnabit in augustissimo Monspelliensis Apollinis fano ANTONIUS
DE LANQUINA Illiberitanus, Apud Rucinonenses, Artium Liberalium
Magister, & jamdudum Medicina Studiosus ab hora octava usque ad meridiem;
Dic mensis Decembris 1711.